

基礎ゼミ I 問題 4 2020 年 5 月 11 日

(1), (2), ... の小問は別の人が解いて発表しても構いませんが、(a), (b), ... の小問は同じ人が発表してください。

問 4.1. a_0, a_1, p, q を実数とし、 $n \geq 2$ に対して a_n を漸化式 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$, $n = 0, 1, 2, \dots$, によって定め、 $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ とおく。このとき、 $p^2 + 4q < 0$ であれば数列 $\{b_n\}$ は発散することを示せ。

問 4.2. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = c$ が存在して $c < 1$ ならば、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ を示せ。

(2) 正の数からなる数列 $\{a_n\}$ について、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = c$ が存在して $c > 1$ ならば、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ を示せ。

問 4.3. 数列 $\{a_n\}$ について、ある実数 $0 < L < 1$ があって、すべての $n \in \mathbf{N}$ に対して $|a_{n+2} - a_{n+1}| \leq L|a_{n+1} - a_n|$ が成立すると仮定する。このとき、 $\{a_n\}$ は Cauchy 列 (cf. 微分積分学の教科書 p.21) となることを示せ。

問 4.4. 問 4.3 を用いて次で定義される数列 $\{a_n\}$ が Cauchy 列となることを示し、その極限を求めよ。

(1) $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n + 2}$, $a_1 = p > 0$,

(2) $a_{n+2} = (1-c)a_{n+1} + ca_n$, $a_1 = p$, $a_2 = q$, ただし、 c, p, q は実数で、 c は $0 < |c| < 1$ を満たす。

ヒント: $a_{n+2} + ca_{n+1} = a_{n+1} + ca_n = \dots = a_2 + ca_1$ で $n \rightarrow \infty$ とすれば極限值がわかる。

定義 (ε - δ 論法 1). x が α に近づくとき (ただし $x \neq \alpha$)、関数 $f(x)$ が実数 a に収束するとは、任意の正数 ε に対してある (ε から定まる) 正数 δ が存在して、 $0 < |x - \alpha| < \delta \implies |f(x) - a| < \varepsilon$ が成立することと定義する。このとき $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = a$, あるいは $f(x) \rightarrow a$ ($x \rightarrow \alpha$) と表す。

$f(x)$ が収束しないとき、 $f(x)$ は発散するという。

定義 (ε - δ 論法 2). x が α に近づくとき (ただし $x \neq \alpha$)、関数 $f(x)$ が ∞ に発散するとは、任意の正数 K に対してある (ε から定まる) 正数 δ が存在して、 $0 < |x - \alpha| < \delta \implies f(x) > K$ が成立することと定義する。このとき $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \infty$, あるいは $f(x) \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow \alpha$) と表す。

問 4.5. (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ の ε - δ 論法による定義を書け。

問 4.6. (a) $\lim_{x \rightarrow \alpha+0} f(x) (= \lim_{x \downarrow \alpha} f(x)) = a$, (b) $\lim_{x \rightarrow \alpha-0} f(x) (= \lim_{x \uparrow \alpha} f(x)) = \infty$ の ε - δ 論法による定義を書け。

問 4.7. $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = a$ の必要十分条件は $x_n \rightarrow \alpha$ ($n \rightarrow \infty$), $x_n \neq \alpha$ ($n = 1, 2, \dots$) なる任意の数列 $\{x_n\}$ に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$ であることを示せ。

問 4.8. $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = b$ とする。 ε - δ 論法を用いて (問 4.7 を用いずに) 次を示せ。

(1) (a) $\lim_{x \rightarrow \alpha} |f(x)| = |a|$, (b) $\lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) \pm g(x)) = a \pm b$,

(2) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)g(x) = ab$, (3) $b \neq 0$ のとき $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{b}$, (4) $f(x) \leq g(x)$ のとき $a \leq b$

注意: 問 4.7 を用いると、教科書第 1 章の数列に関する定理 1-5 から上記が成立することが直ちに従う。

問 4.9. 次の極限值を求めよ。ただし、 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$ は既知とする。

(1) (a) $\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{2x^2 - 3x - 2}{|x^2 - x - 2|}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \tan x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ (d) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{2}{1-x}}$

(2) (a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)$ (b) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(\cos x)}{x - \frac{\pi}{2}}$ (c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) + \sin(x-h) - 2 \sin x}{h^2}$

(3) (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x})$ (b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x^2 - 1)}{\sin(x - 1)}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

問 4.10. \mathbb{R} で定義された連続関数 $f(x)$ が $f(x+y) = f(x) + f(y)$ を満たすとすると、定数 a が存在して、 $f(x) = ax$ となることを示せ。(注意: 一般には、 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ を満たしても $f(x) = ax$ とならない例が知られている。)