

基礎ゼミ I 問題 9 2021 年 6 月 14 日

(1), (2), ... の小問は別の人が解いて発表しても構いませんが、(a), (b), ... の小問は同じ人が発表してください。次ページにヒントを書きました。参照ください。

問 9.1. 次の関数の  $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$  を計算せよ ( $a, b > 0$  は定数)。ヒント:  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$

(1)  $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$       (2)  $\begin{cases} x = a \cosh t, \\ y = a \sinh t \end{cases}$       (3)  $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = b \sin^3 t \end{cases}$       (4)  $\begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^2}, \\ y = \frac{3at^2}{1+t^2} \end{cases}$

問 9.2.  $f(x)$  を区間  $(a, b)$  上の関数とし、 $a < c < b$  となる点  $x = c$  で  $f(x)$  は微分可能であるとする。 $f(x)$  が  $x = c$  で極大値をとれば  $f'(c) = 0$  となることを示せ。(極小値のときも同様に  $f'(c) = 0$  が示せる。)

問 9.3. 両辺の導関数が一致することを示し、(平均値の定理を用いて) 次を示せ。

(1)  $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \tan^{-1} x \quad (x > 0)$       (2)  $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \tan^{-1} x \quad (x \in \mathbf{R})$   
 (3)  $\tan \left( \frac{1}{2} \sin^{-1} x \right) = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \quad (-1 \leq x \leq 1)$

問 9.4. 次の不等式を示せ。

(1)  $\frac{2}{\pi} x < \sin x < x \quad \left( 0 < x < \frac{\pi}{2} \right)$       (2)  $x < \sin^{-1} x < \frac{\pi}{2} x \quad (0 < x < 1)$   
 (3)  $x - \frac{x^3}{3} < \tan^{-1} x < x \quad (x > 0)$       (4)  $|\sin b - \sin a| \leq |b - a| \quad (a < b)$   
 (5)  $0 < a < b < 1$  のとき、 $p > q > 0$  ならば  $\frac{b^p - a^p}{b^q - a^q} < \frac{p}{q}$ .

問 9.5.  $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  のとき、 $\frac{x^p}{p} + \frac{1}{q} - x \geq 0 \quad (x \geq 0)$  を示せ。また、これより  $a > 0, b > 0$  ならば  $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$  となることを示せ。

問 9.6.  $f(x) = x^{1/x} \quad (x > 0)$  の増減を調べることにより、 $m > n \geq e$  ならば、 $m^n < n^m$  となることを示せ。

問 9.7.  $f(x)$  が  $(a, \infty)$  で微分可能で、 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = l$  であるとき、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x+1) - f(x)\} = l$  であることを示せ。

問 9.8. 次の極限値を求めよ。ただし、l'Hopital の定理を用いるときは、不定形であることを明記せよ。 $(a > 0$  は定数。)

(1) (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\tan x} - \frac{1}{x} \right)$       (b)  $\lim_{x \rightarrow +0} x^{-2} e^{-\frac{1}{x}}$       (2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{ax - (\log x)^2\}$   
 (3) (a)  $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\tan \frac{\pi}{2} x}$       (b)  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x}$       (4)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$   
 (5) (a)  $\lim_{x \rightarrow \pi/2-0} \frac{\log \left( \frac{\pi}{2} - x \right)}{\tan x}$       (b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a e^{-(\log x)^2}$       (6)  $\lim_{x \rightarrow +0} \left( \frac{1}{x} \right)^{\sin x}$   
 (7) (a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \log x \log \left( 1 + \frac{1}{x} \right)$       (b)  $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \left( x \tan x - \frac{\pi}{2} \sec x \right)$       (8)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \right)^{\frac{1}{x}}$

問 9.9. 次の関数の  $n$  次導関数を求めよ。ヒント: (4), (5) は Leibniz の公式 (cf. 教科書 p.62) を用いよ。

(1)  $\frac{1}{1-2x}$       (2)  $\sin^3 x$       (3)  $e^x \cos x$       (4)  $x^3 e^{2x}$       (5)  $x^2 \sin 3x$       (6)  $x^{n-1} \log x$

問 9.3 (3) と問 9.8 (2) の解答例です。(この 2 問は発表できません。)

問 9.3 (3) 解答例: (問 9.3 (1), (2) は以下を参考にしてください。)

$f(x) = \tan\left(\frac{1}{2}\sin^{-1}x\right) - \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$  とすると、 $-1 < x < 1$  のとき、

$$\left\{ \tan\left(\frac{1}{2}\sin^{-1}x\right) \right\}' = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{1}{2}\sin^{-1}x\right)} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \stackrel{(*)}{=} \frac{2}{1 + \cos(\sin^{-1}x)} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\stackrel{(**)}{=} \frac{1}{1 + \sqrt{1 - \sin^2(\sin^{-1}x)}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{1 + \sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

ここで  $(*)$  では  $\cos^2\theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$  を、 $(**)$  では  $-\frac{\pi}{2} \leq \sin^{-1}x \leq \frac{\pi}{2}$  より  $\cos(\sin^{-1}x) \geq 0$  に注意して

$\cos(\sin^{-1}x) = \sqrt{1 - \sin^2(\sin^{-1}x)}$  を用いた。

一方、 $\left(\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}\right)' = \dots = \frac{1}{1 + \sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  (高校数学 III の範囲で計算できる) より、 $f'(x) = 0$  を得る。

よって、 $f(0) = 0 - 0 = 0$  より、 $-1 \leq x \leq 1$  のとき平均値の定理により

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\theta x)(x - 0) \quad (0 < \theta < 1) \quad (1)$$

となる  $\theta$  が存在するが  $f'(\theta x) = 0$  より  $f(x) = 0$  すなわち、

$$\tan\left(\frac{1}{2}\sin^{-1}x\right) = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$$

が成立する。 //

注意: 式 (1) で  $0 < \theta < 1$  より  $-1 \leq x \leq 1$  に対し  $-1 < \theta x < 1$  となっている。

問 9.8 (2) 解答例: (l'Hopital の定理の使い方の参考にしてください。)

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{ax - (\log x)^2\} = \lim_{x \rightarrow \infty} ax \left\{1 - \left(\frac{\log x}{x^{1/2}}\right)^2\right\}$  で、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^{1/2}} = \frac{\infty}{\infty}$  の不定形なので l'Hopital の定理より

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\log x)'}{(x^{1/2})'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2}x^{-1/2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0.$$

よって、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{ax - (\log x)^2\} = \lim_{x \rightarrow \infty} ax \left\{1 - \left(\frac{\log x}{x^{1/2}}\right)^2\right\} = \infty.$  //

追加の ヒントです。

問 9.4 (5) Cauchy の平均値の定理を用いよ。

問 9.8 (1) (b)  $t = \frac{1}{x}$  とおく。  $x \rightarrow +0$  より  $t \rightarrow \infty$  に注意。

(2), (6), (8) は対数をとって考えよ。

問 9.9 (1)  $\left(\frac{1}{1-2x}\right)^{(n)}$  は  $n = 1, 2$  を求め、 $n$  のときを予想しそれを数学的帰納法を用いて示せ。

(4) Leibniz の公式より

$$(x^3 e^{2x})^{(n)} = x^3 (e^{2x})^{(n)} + {}_n C_1 (x^3)' (e^{2x})^{(n-1)} + {}_n C_2 (x^3)'' (e^{2x})^{(n-2)} + \dots \text{ で、}$$

$k \geq 4$  のとき  $(x^3)^{(k)} = 0$  に注意せよ。

(5) (4) と同様に Leibniz の公式を用いる。さらに、

$$(\sin 3x)' = 3 \cos 3x = 3 \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$(\sin 3x)'' = 3 \left\{ \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) \right\}' = 3^2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 3^2 \sin\left(3x + \frac{2\pi}{2}\right)$$

を繰り返し用い  $(\sin 3x)^{(k)}$  を求める。

(6)  $(x^{n-1} \log x)^{(n)} = \frac{(n-1)!}{x}$  となります。数学的帰納法を用いて示してください。